



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – Piazzi”

C. F. 97279060822 – Cod. Mecc. PAIC8AL00X

Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Mario Rutelli , 50 – 90143 Palermo - tel. 091/343733

Direzione Didattica: Via Sampolo , 63 – 90143 Palermo - tel. 091/6251601

pec: paic8al00x@pec.istruzione.it - peo: paic8al00x@istruzione.it

Sito web: www.icgiovanni23piazzi.edu.it

I.C.S. "GIOVANNI XXIII-PIAZZI"-PALERMO
Prot. 0000531 del 17/01/2024
IV (Uscita)

Al personale della scuola

Ai genitori

Alla DSGA

E p.c. alla RSPP Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo

studiotecnicorandazzo@gmail.com

Al medico competente Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio

laralocascio@yahoo.it

Al Sito web della scuola

OGGETTO: Aumento dell'incidenza di scarlattina e di infezione invasiva da streptococco di gruppo A (nota Ministero della Salute 0011710-12/04/2023-DGPRES-DGPRES-P- m_pi.AOOU SPME.REGISTRO UFFICIALE. E. 0029201.12-12-2023.h.11:14) e **principali norme di profilassi previste in caso di malattia infettiva quale la scarlattina.**

Con la presente si trasmette alle SS.LL. la Nota del Ministero della Salute contenente informazioni inerenti all'aumento dei casi di scarlattina e di malattia invasiva da streptococco di gruppo A registrati soprattutto, nel corso della seconda metà dell'anno 2022, con maggiore incidenza nei Paesi centro europei. A livello Nazionale, si rende noto che, a partire da gennaio 2023, sono in aumento i casi di scarlattina soprattutto nei bambini di età inferiore ai 15 anni.

Le infezioni possono presentarsi inizialmente con sintomi aspecifici (febbre, stanchezza generale, perdita di appetito) e i bambini, in particolare, possono avere una rapida progressione verso una forma di malattia grave. Pertanto, i genitori/tutori dovrebbero richiedere una valutazione clinica nel caso il proprio bambino presenti sintomi preoccupanti e non migliori clinicamente.

Nel caso in cui vengono segnalate infezioni nella nostra scuola occorre seguire le principali norme di profilassi previste in caso di malattia infettiva quale la scarlattina.

- Effettuare l'autosorveglianza sanitaria per sette giorni a partire dall'ultimo contatto con il caso di scarlattina. Si ricorda che la malattia si trasmette per via aerea tramite grosse goccioline respiratorie. La sorveglianza sanitaria consiste nel rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre ed eventuale esantema.
- Recarsi, solo in presenza di sintomatologia, (*con mascherina chirurgica o ffp2*) dal proprio medico curante/pediatra richiedere, a giudizio del medico, l'effettuazione del tampone faringeo per la ricerca dei germi comuni.
- Nel caso la risposta sia positiva per streptococco beta-emolitico di gruppo A, ritornare dal proprio medico curante per eventuali ed idonee prescrizioni. Misure di igiene ambientale:
 - Aerare i locali più frequentemente e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro ed i giocattoli con prodotti disinfettanti di uso comune.
 - Per la riammissione a scuola è necessario che i genitori consegnino a scuola il certificato del medico curante che attesta la pronta guarigione del/la proprio/a figlio/a.
 - Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – Piazzi”

C. F. 97279060822 – Cod. Mecc. PAIC8AL00X

Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Mario Rutelli , 50 – 90143 Palermo - tel. 091/343733

Direzione Didattica: Via Sampolo , 63 – 90143 Palermo - tel. 091/6251601

pec: paic8al00x@pec.istruzione.it - peo: paic8al00x@istruzione.it

Sito web: www.icgiovanni23piazzi.edu.it

INFORMATIVA SULLA SCARLATTINA

DEFINIZIONE

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo streptococco beta emolitico di gruppo A. Questo germe può essere responsabile anche di altre malattie quali la tonsillite e l'impetigine (o piodermite, che è un'infezione della cute). Poiché esistono diversi ceppi di questo streptococco, ci si può ammalare di scarlattina più volte. È una malattia che colpisce soprattutto i bambini in età scolare (mentre è molto rara prima dei 6 mesi di vita).

DESCRIZIONE

Come ci si contagia. Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione.

In seguito al contagio, lo streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità.

In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

LA PREVENZIONE.

L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate.

Cosa fare quando si verifica un caso. Essendo una malattia batterica si cura con idonei antibiotici, anche allo scopo di prevenire la malattia reumatica, per cui, nel sospetto, è sempre bene consultare il medico. Tenere a casa la persona fino a quando è malata e, comunque, per almeno 24 ore dall'inizio della terapia antibiotica, evitando il contatto diretto con altri bambini.

Rischio di diffusione nella scuola. Medio. La diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoce del caso.

Riammissione a scuola. Un bambino può tornare in comunità non prima di 48 ore dall'inizio della terapia antibiotica, in ogni caso quando ritorna ad essere in buone condizioni di salute, attestate da regolare certificato medico di pronta guarigione, da consegnare a scuola.

Si sottolinea che importanti misure di protezione sono: un'adeguata igiene delle mani e delle vie respiratorie e un'adeguata areazione degli ambienti interni.

Una buona igiene delle mani e l'eliminazione di possibili comportamenti promiscui (ad esempio, condividere utensili, bicchieri e oggetti personali, ecc.) possono contribuire a controllare la trasmissione dell'infezione.

Le misure di profilassi da adottare negli ambienti scolastici sono:

- Rispetto delle buone regole di pulizia e aerazione dei locali ;
- Corretta igiene delle mani e dell'igiene personale in generale;
- Disinfezione degli arredi e delle superfici;



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – Piazzì”

C. F. 97279060822 – Cod. Mecc. PAIC8AL00X

Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Mario Rutelli , 50 – 90143 Palermo - tel. 091/343733

Direzione Didattica: Via Sampolo , 63 – 90143 Palermo - tel. 091/6251601

pec: paic8al00x@pec.istruzione.it - peo: paic8al00x@istruzione.it

Sito web: www.icgiovanni23piazzì.edu.it

-
- Disinfezione dei giocattoli nelle scuole dell'Infanzia.

Considerata l'importanza della tematica, si invita tutto il personale scolastico a prestare particolare attenzione a quanto indicato nella circolare di seguito allegata.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Aurelia Patanella

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n.39/93